

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU  
ANTE NATAL CARE (ANC) PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS  
TLOGOSARI KULON TAHUN 2017**

**SUCIA NADILA**

(Pembimbing : Kismi Mubarokah, S.KM, M.Kes)  
*Kesehatan Masyarakat - S1, FKes, Universitas Dian  
Nuswantoro  
www.dinus.ac.id  
Email : 411201301747@mhs.dinus.ac.id*

**ABSTRAK**

Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemeriksaan ANC (Ante Natal Care) untuk melihat riwayat penyakit menular atau tidak menular sehingga menyebabkan faktor risiko tinggi pada ibu hamil. Penyebab kematian ibu tertinggi yaitu karena tumor otak, kanker tulang, kanker getah bening, penyakit jantung bawaan (PJB), kanker mamae dan AIDS. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ante natal care pada ibu hamil.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional dengan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner dan wawancara yang digunakan untuk uji faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ante natal care dengan jumlah populasi 292 dan data yang diambil sejumlah 88 ibu hamil. Analisis data menggunakan uji Fisher Exact Test.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara umur ( $p=1,000$ ), pendidikan ( $p=0,589$ ), jumlah anak ( $p=0,179$ ), peristiwa pada kehamilan lalu ( $p=1,000$ ), saran petugas kesehatan ( $p=0,342$ ), persepsi ( $p=0,251$ ) dengan perilaku ante natal care dan terdapat hubungan yang signifikan antara keadaan kesehatan ( $p=0,044$ ). Kebanyakan ibu hamil sudah sesuai dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dari trimester ke-1 sampai trimester ke-4. Ibu hamil melakukan pemeriksaan setiap bulan agar menjaga kehamilan dan dapat mendeteksi risiko dini terhadap kehamilan.

Bagi petugas kesehatan dapat memberikan materi atau memberikan penyuluhan mengenai pemeriksaan kehamilan agar ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan secara rutin dan mendeteksi dini risiko terhadap kehamilan.

Kata Kunci : Kematian Ibu, Perilaku, Ante Natal Care

## **FACTORS RELATED TO ANTE NATAL CARE BEHAVIOR ON MATERNAL IN TLOGOSARI KULON PRIMARY HEALTH CARE 2017**

**SUCIA NADILA**

(Lecturer : Kismi Mubarokah, S.KM, M.Kes)

*Bachelor of Public Health - S1, Faculty of Health Science,*

*DINUS University*

*www.dinus.ac.id*

*Email : 411201301747@mhs.dinus.ac.id*

### **ABSTRACT**

A lack of knowledge of mothers on the examination of the ANC (Antenatal) to view a history of infectious or non-infectious, causing a high risk factor in pregnant mother. The cause of the highest maternal mortality is due to a brain tumor, bone cancer, lymphatic cancer, congenital heart disease (CHD), mammary cancer and AIDS. The purpose of this study to determine the factors associated with the behavior of antenatal care to pregnant women.

This type of research using approach cross sectional with quantitative methods with questionnaire and interview were used to test the factors relating to the behavior of antenatal care with a population of 292 and the data retrieved a number of 88 pregnant women. Data analysis used Fisher's Exact Test.

The results showed that no significant relationship between age ( $p=1.000$ ), education ( $p=0.589$ ), the number of children ( $p=0.179$ ), events in pregnancy and then ( $p=1.000$ ), health workers' advice ( $p=0.342$ ), perception ( $p=0.251$ ) with the behavior of antenatal care for and there is a significant relationship between the state of health ( $p=0.044$ ). Most pregnant women have met in examinations trimester of pregnancy from the 1st until the 4th trimester. Pregnant women do checks every month in order to maintain the pregnancy and can detect early risk to pregnancy.

For health workers can provide materials or provide education about prenatal care for pregnant women can perform routine checkups and early detection of risks to the pregnancy.

**Keyword** : Maternal Mortality, Behavior, Ante Natal Care